

Avertissements agricoles

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-10-86003969

ILE DE FRANCE

ISSN 0767-5542



Ministère de l'Agriculture
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
47, Rue Paul Doumer - 93100 MONTREUIL.
tél : 42/87/76/71.



PUBLICATION PERIODIQUE CPP N° 536 A D
Abonnement annuel : 140 F
Régisseur des Recettes : D.D.A.
C.C.P. 9063 96 U PARIS .

EDITION GRANDES CULTURES

BULLETIN n° 330 du 9 OCTOBRE 1986 Envoi n° 19

CEREALES : Les premiers pucerons d'Automne

COLZA : Situation calme

CEREALES

■ PUCERONS et JAUNISSE NANISANTE :

Généralités : Les symptômes de cette maladie sont bien visibles à partir du mois d'Avril : les plantes sont naines, jaunies et atteintes en foyers.

Mais c'est en Automne que la maladie est transmise :
Les pucerons quittent le maïs ou les repousses de céréales, pour s'installer sur les jeunes plantes levées.

Pour une parcelle de céréales d'hiver, les risques d'attaques sont plus importants lorsque :

- le semis est réalisé précocement,
- les réservoirs de pucerons sont nombreux à proximité de la parcelle : maïs non broyés, repousses non éliminées.
- les températures sont douces : supérieures à 12° (elles favorisent alors l'activité des pucerons).

En 1985, les levées tardives ont diminué considérablement les risques de jaunisse : les interventions chimiques ont été très rares. Cependant, il est intéressant de signaler que les rares parcelles semées avant la fin Septembre, et non traitées, ont montré des chutes de rendement pouvant atteindre 30% (résultats essais)

Situation : * de nombreux semis d'orge d'hiver ou même de blé ont été réalisés précocement,

* le vol de pucerons a augmenté de façon très sensible depuis le 30 septembre (suivi journalier réalisé à la tour à succion de Versailles)

* les pucerons s'observent sur les repousses, et arrivent sur premières céréales levées.

Préconisations : * dès la levée des céréales, surveiller régulièrement les parcelles ,de préférence en fin d'après-midi.

* Lorsqu'**au moins un pied sur 10** porte des pucerons ,une intervention est nécessaire. Ce seuil correspond à une observation des pucerons ,en se promenant dans la parcelle, sans beaucoup chercher.

* Quels produits utiliser ?

Matière active	Spécialités	Firme	Dose en l/ Ha
<i>alphaméthrine</i>	FASTAC	Agrishell	0,2 1
<i>biphenthrine</i>	TALSTAR	Pépro	0,075 1
<i>bromophos</i>	NEXION 25	Basf	1,5 1
<i>cyalothrine</i>	KARATE	Sopra	0,15 1
<i>cyperméthrine</i>	CYMBUSH	Sopra	0,2 1
	KAFIL super	LaQuino	0,2 1
	MASTOR	R.S.R.	0,4 1
	SHERPA 10	Pépro	0,2 1
<i>deltaméthrine</i>	DECIS CE	Procida	0,3 1
<i>fenvalérate</i>	SUMICIDIN 10	Agrishell	0,25 1
<i>fluvalinate</i>	MAVRIK	Sandoz	0,2 1

Notre prochain bulletin fera le point sur l'infestation des parcelles et l'éventualité d'un traitement .

COLZA

■ **Altises** : Toutes les parcelles ont dépassé le stade de sensibilité aux morsures (2 feuilles vraies).

Les cuvettes jaunes ont piégé très peu d'insectes jusqu'ici : moins de 15 captures par cuvette.

Intervention non justifiée .

■ **Mildiou** : Les fortes rosées matinales ont favorisé le mildiou. Cependant , une incidence sur le rendement n'a pas été démontrée.

■ **Mouche du chou** : Nous vous rappelons qu'un traitement en pulvérisation du feuillage est inefficace contre ce ravageur .
